

ความคงตัวของยาฉีดหลังการละลายผงยา (Reconstitution)

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

ชื่อยา	ความแรง	สารละลายที่ใช้	ความคงตัวหลังการละลาย		หมายเหตุ
			25°c	2-8°c	
Ampicillin inj.	1 g	SWFI 7.4 ml	1 ชั่วโมง	-	
Cefazolin inj.	1 g	SWFI 10 ml	3 วัน	7 วัน	เก็บยาให้พ้นแสง
Ceftazidime inj.	1 g	SWFI 10 ml	30 ชั่วโมง	30 ชั่วโมง	เก็บยาให้พ้นแสง
Ceftriaxone inj.	1 g	SWFI 10 ml	-	24 ชั่วโมง	
Cloxacillin inj.	1 g	SWFI 10 ml	24 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	
Meropenem inj.	1 g	SWFI 20 ml	8 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	
Piperacillin + Tazobactam inj.	4.5 g	SWFI 20 ml	12 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	
Hydrocortisone inj.	100 mg	SWFI 2 ml	3 วัน	-	เก็บยาให้พ้นแสง
Green pit viper antivenin	-	SWFI 10 ml	24 ชั่วโมง	-	

มิถุนายน 2566