

แนวทางการบริหารยาฉีดแบบ IV push โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

ยา	เจือจาง/ละลายด้วย	ระยะเวลาในการฉีด	หมายเหตุ
Adenosine inj. 3 mg/ml	ไม่ต้องเจือจาง	1 – 3 วินาที (Rapid injection)	- ไม่ควรฉีดยาบริเวณส่วนปลายมือ แขน ขา และเท้า - หลังจากการให้ยาควร flush ด้วย NSS 20 ml
Ampicillin inj. 1 g	SWFI 10 ml	3 – 5 นาที	ขนาดยา ≤ 500 mg
Cefazolin inj. 1 g	SWFI 10 ml	3 – 5 นาที	
Atropine sulfate inj. 0.6 mg/ml	SWFI 10 ml	≥ 1 นาที	
Chlorpheniramine inj. 10 mg/ml	ไม่ต้องเจือจาง	≥ 1 นาที	
Dexamethasone inj. 4 mg/ml	ไม่ต้องเจือจาง	≥ 1 นาที	
Diazepam inj. 10 mg/2 ml	ไม่ต้องเจือจาง	≥ 3 นาที (ไม่มากกว่า 5 mg/นาที)	
Dimenhydrinate inj. 50 mg/ml	NSS 10 ml	≥ 2 นาที	
Furosemide inj. 20 mg/2 ml	ไม่ต้องเจือจาง	1 – 2 นาที	ขนาดยา ≤ 80 mg
Haloperidol inj. 5 mg/ml	ไม่ต้องเจือจาง	1 นาที	
Hydrocortisone inj. 100 mg	SWFI 2 ml	30 วินาที – 10 นาที	

ยา	เจือจาง/ละลายด้วย	ระยะเวลาในการฉีด	หมายเหตุ
Hyoscine-N-butylbromide inj. 20 mg/ml	ไม่ต้องเจือจาง	1 – 2 นาที	
Meropenem inj. 1 g	SWFI 20 ml	5 นาที	
Metoclopramide inj. 10 mg/2 ml	ไม่ต้องเจือจาง	1 – 2 นาที	ขนาดยา ≤ 10 mg
Morphine sulfate inj. 10 mg/ml	SWFI 4 - 5 ml	4 – 5 นาที	ขนาดยา 2.5 – 15 mg
Omeprazole inj. 40 mg	SWFI 10 ml	3 – 5 นาที	
Pethidine HCl inj. 50 mg/ml	SWFI 5 ml	≥ 5 นาที	
Tramadol HCl inj. 50 mg/ml	SWFI, NSS 8 - 10 ml	2 – 3 นาที	
Tranexamic acid inj. 250 mg/5 ml	ไม่ต้องเจือจาง	3 – 5 นาที	อัตราเร็วไม่เกิน 100 mg/min
Vitamin K1, Phytonadione [10 mg/ml]	NSS 10 ml	≥ 10 นาที	อัตราเร็วไม่เกิน 1 mg/min