

แนวทางการบริหารยาฉีดแบบ IV push โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

ยา	เจ็องจาง/ละลายด้วย	ระยะเวลาในการฉีด	หมายเหตุ
Adenosine inj 3 mg/ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	1 - 2 วินาที	- ไม่ควรฉีดยาบริเวณส่วนปลายมือ แขน ขา และเท้า - หลังจากการให้ยาควรชะล้างสายให้ยาด้วย NSS 20 ml
Ampicillin inj	ละลายด้วย SWFI 10 ml	3 - 5 นาที	ขนาดยา ≤ 500 mg
Chlorpheniramine inj 10 mg/ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	1 นาที	
Dexamethasone inj 4 mg/ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	≥ 1 นาที	
Diazepam inj 10 mg/2 ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	≥ 2 นาที	
Dimenhydrinate inj 50 mg/ml	NSS 10 ml	≥ 2 นาที	
Furosemide inj 20 mg/2 ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	1 - 2 นาที	ขนาดยา ≤ 40 mg
Haloperidol inj 5 mg/ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	1 นาที	
Hyoscine-N-butylbromide inj 20 mg/ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	1 - 2 นาที	
Metoclopramide inj 10 mg/2 ml	ไม่ต้องเจ็องจาง	1 - 3 นาที	ขนาดยา ≤ 10 mg
Morphine sulfate inj 10 mg/ml	SWFI 4 - 5 ml	3 - 5 นาที	ขนาดยา 2.5 - 15 mg
Pethidine HCl inj 50 mg/ml	SWFI 5 ml	≥ 5 นาที	
Pralidoxime inj 1 g	ละลายด้วย SWFI 20 ml	≥ 5 นาที	
Ranitidine inj 50 mg/2 ml	NSS, D5W 20 ml	≥ 5 นาที	ขนาดยา 50 mg
Tramadol inj 100 mg/2 ml	SWFI, NSS 8 - 10 ml	2 - 3 นาที	