

ขนาดการใช้ยาสำหรับรายการยานอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

1. ยาแก้ปวด / ลดไข้

ยา (รูปแบบ)	ขนาดยา	น้ำหนักตัว	ขนาดการใช้ยา	ความถี่
Paracetamol 325 mg (เม็ด)	10-15 MKDose	11-16 kg	ครึ่ง เม็ด	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		22-32 kg	1 เม็ด	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
Paracetamol 500 mg (เม็ด)	10-15 MKDose	17-25 kg	ครึ่ง เม็ด	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		33-50 kg	1 เม็ด	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		50-75 kg	1 เม็ด ครึ่ง	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		67 kg ขึ้นไป	2 เม็ด	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
Paracetamol 120 mg/5 ml (syrup)	10-15 MKDose	4-6 kg	2.5 ซีซี (ครึ่ง ช้อนชา)	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		7-9 kg	4 ซีซี	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		8-12 kg	5 ซีซี (1 ช้อนชา)	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		12-18 kg	7.5 ซีซี (1 ช้อนชาครึ่ง)	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
		16-24 kg	10 ซีซี (2 ช้อนชา)	ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ
Ibuprofen 100 mg/5 ml (syrup)	อายุ ≥ 6 เดือน: 5-10 MKDose	5 kg	1.5-2.5 ซีซี	วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
		10 kg	2.5-5 ซีซี	
		15 kg	3.75-7.5 ซีซี	
		20 kg	5-10 ซีซี	
Diclofenac 25 mg (เม็ด)	อายุ ≥ 12 ปี: 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น			

2. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก แก้คัน

ยา (รูปแบบ)	ขนาดยา	ความถี่การบริหารยา	ขนาดการใช้ยา (mL/dose)							
			5 kg	8 kg	10 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg	25 kg
Chlorpheniramine 2 mg/5 ml (syrup)	0.35 MKDay	ทุก 4-6 ชั่วโมง	1.5	2.5	3	4	4.5	5.5	6	7.5
Chlorpheniramine 4 mg (เม็ด)	อายุ 6-11 ปี : 2 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ : 4 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง									

3. ยาแก้วิงเวียนศีรษะ

Dimenhydrinate 50 mg (เม็ด): 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการ

4. ยาลดกรด ขับลม แก้อาเจียน ผงน้ำตาลเกลือแร่

ยา (รูปแบบ)	ขนาดยา	ความถี่การบริหารยา	ขนาดการใช้ยา (mL/dose)							
			5 kg	8 kg	10 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg	25 kg
Domperidone 1 mg/ml (suspension)	0.2-0.4 MKDose	วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร	1.5	2	2.5	3	3.5	4.5	5	6
Berclomine syrup (Dicyclomine HCl 5 mg, Simethicone 50 mg/5 ml)	อายุ < 4 ปี : ครั้ง ช้อนชา ก่อนให้นม อายุ 4-12 ปี : 1 ช้อนชา วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน ผู้ใหญ่ : 2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน									
Belcid suspension	15-30 ซีซี วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน									

4. ยาลดกรด ขับลม แก่คลื่นไส้ อาเจียน ผงน้ำตาลเกลือแร่ (ต่อ)

ยา (รูปแบบ)	ขนาดการใช้ยา
Omeprazole 20 mg (แคปซูล)	น้ำหนัก \geq 20 kg : 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร
Domperidone 10 mg (เม็ด)	น้ำหนัก 13-25 kg : ครึ่ง เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร น้ำหนัก $>$ 25 kg : 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
Drotaverine 40 mg (เม็ด)	อายุ \geq 6 ปี : 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อน/หลังอาหาร ผู้ใหญ่ : 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อน/หลังอาหาร
Simethicone 80 mg (เม็ด)	1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ORS 3.3 gm	1 ซอง ผสมน้ำ 5 ออนซ์ (150 ซีซี) จิบบ่อย ๆ แทนน้ำ

5. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ขยายหลอดลม

ยา (รูปแบบ)	อายุ	ขนาดการใช้ยา	ความถี่การบริหารยา
Guaifenesin 100 mg/5 ml (syrup)	อายุ $<$ 2 ปี	ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์	
	อายุ 2-6 ปี	ครึ่ง - 1 ช้อนชา	ทุก 4 ชั่วโมง
	อายุ 6-12 ปี	1-2 ช้อนชา	ทุก 4 ชั่วโมง
Salbutamol syrup 2 mg/5 ml (syrup)	อายุ 2-6 ปี	ครึ่ง - 1 ช้อนชา	วันละ 3-4 ครั้ง
	อายุ 6-12 ปี	1 ช้อนชา	วันละ 3-4 ครั้ง
	อายุ $>$ 12 ปี และผู้ใหญ่	1-2 ช้อนชา	วันละ 3-4 ครั้ง
ยาแก้ไอขับเสมหะผสมอะมโมเนียมคาร์บอเนต (Ammon Carb)	อายุ 1-3 ปี	ครึ่ง ช้อนชา	วันละ 3-4 ครั้ง
	อายุ 3-6 ปี	1 ช้อนชา	วันละ 3-4 ครั้ง
	อายุ 6-12 ปี	2 ช้อนชา	วันละ 3-4 ครั้ง

5. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ขยายหลอดลม (ต่อ)

ยา (รูปแบบ)	อายุ	ขนาดการใช้ยา	ความถี่การบริหารยา
Dextromethorphan 15 mg (เม็ด)	อายุ 6-12 ปี	ครึ่ง - 1 เม็ด	วันละ 3-4 ครั้ง
	อายุ > 12 ปี และผู้ใหญ่	1 เม็ด	วันละ 3-4 ครั้ง
Guaifenesin 100 mg (เม็ด)	1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร		

6. ยาปฏิชีวนะ (Antibacterial drugs)

ยา (รูปแบบ)	ขนาดยา	ความถี่การบริหารยา	ขนาดการใช้ยา (ml/dose)			
			5 kg	10 kg	15 kg	20 kg
Amoxicillin dry syrup 250 mg/5 ml	Pharyngitis, Tonsillitis: 25-50 MKDay	วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า-เย็น (X 10 วัน)	1.25 - 2.5	2.5 - 5	3.8 - 7.5	5 - 10
Dicloxacillin dry syrup 62.5 mg/5 ml	12.5-25 MKDay	วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน	1.25 - 2.5	2.5 - 5	3.8 - 7.5	5 - 10
Erythromycin dry syrup 125 mg/5 ml	30-50 MKDay	วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน	1.5 - 2.5	3 - 5	4.5 - 7.5	6 - 10
Co-trimoxazole suspension (SMX 200 mg + TMP 40 mg/5 ml)	อายุ 2 เดือนขึ้นไป 6-12 MKDay TMP	วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า-เย็น	2 - 3.8	3.8 - 7.5	5.6 - 11.3	7.5 - 15

เอกสารอ้างอิง

Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP and Lance ll. Drug Information Handbook International. Version 4.4.0 (895) USA: Lexi-Comp; 2023.
MIMS Online Thailand. [Internet]. 2023. Available from: <https://www.mims.com/thailand>.

เอกสารกำกับยา

สิงหาคม 2566