

รายการยาที่ห้ามหักแบ่ง บด เคี้ยวหรือทำให้เม็ดยาแตก
เฉพาะรายการยาที่มีในบัญชียาของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

ชื่อยา	ชื่อการค้า	สาเหตุที่ห้าม	หมายเหตุ
Amoxicillin/ Clavulanic acid	AMK®	ยาจะเหนียวเมื่อบด และ เสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสความชื้น	
Aspirin	Aspent®	Enteric-coated tablet	
Bisacodyl	Bisacod®	Enteric-coated tablet	
Diclofenac	Volta®	Enteric-coated tablet	
Felodipine	Fedil SR®	Sustained-release tablet	
Ferrous sulfate	F-tab®	Sugar-coated tablet	
Isosorbide dinitrate sublingual	Isorem®	Sublingual tablet	
Omeprazole	Omeprazole GPO®	Sustained-release pellet บรรจุใน capsule	ห้ามบดเม็ดยาและแกรนูล ยา แต่สามารถให้ทาง NG tube ได้ (โดยให้ถอด เปลือกแคปซูล เทแกรนูล ยาใส่ใน NG tube และ flush ตามด้วยน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำสับปะรด กรณีปลายสายยางอยู่ใน กระเพาะอาหาร)
Serratiopeptidase	Tanza®	Enteric-coated tablet	
Theophylline	Theotrim®	Sustained-release tablet	สามารถแบ่งครึ่งเม็ดยาได้ ตามรอยบาก

มิถุนายน 2556